



کنڈم کے صحیح استعمال کا طریقہ



1

نئے، اچھے میعار کالیکٹس کنڈم استعمال کریں اور استعمال سے پہلے ختم ہونے کی میعاد چیک کر لیں۔



5

پانی سے تیار کردہ چکنائی دار مادہ استعمال کریں۔ تیل سے تیار شدہ چکنائی دار مادہ کنڈم کو پھاڑ سکتا ہے۔



2

عضو تناسل کے فرج، منہ یا مقعد کو چھونے سے پہلے کنڈم چڑھا لیں۔

انزال کے بعد اور عضو تناسل کے نرم ہونے سے پہلے، کنڈم کو حلقہ (پچھلا گھیرا) سے پکڑیں اور احتیاط سے نکالیں۔



6

3

کنڈم کو احتیاط سے نوک (سرے) سے پکڑ کر ہوا نکالیں۔ اس سے منی کی لٹے جگہ بنے گی۔



7

اہستہ سے کنڈم کو عضو تناسل سے اتاریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ منی باہر نہ کرے۔




8

کنڈم کو تھو میں لپیٹ دیں اور کوڑے دان میں پھینکیں۔



4

اٹھے ہوئے (کھڑے) عضو تناسل کے سرے پر کنڈم چڑھائیں۔ اور اسے دوسرے سرے (بالوں) تک کھول دیں۔



متعلقہ ہاٹ لائنیں

ایڈز ہاٹ لائن (پورٹگھوا، کنٹونیز، انگاش) : (852) 2780 2211
(ایکی شناخت گمنامی اور صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ایچ ای وی (HIV) کیلئے مفت ایڈی ہائی (خون اور بافتوں میں پایا جانے والا ایک مادہ) ٹیسٹ اور مشورہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے)

ایڈز ہاٹ لائن (ٹیگلوگ (طیان کی زبان)، ویب نامی اور تھائی): (852) 2359 9112

ایڈز ہاٹ لائن (ہندی، انڈونیشین، نیپالی اور اردو): (852) 2112 9980

ہم جنس پرست مردوں کی ایچ ای وی ٹیسٹنگ ہاٹ لائن (پورٹگھوا، کنٹونیز، انگاش) : (852) 2117 1069

ہارم ریڈکشن (نقصان میں تخفیف) ہاٹ لائن (پورٹگھوا، کنٹونیز، انگاش) : (852) 2112 9977

ڈاکٹر سیکس ہاٹ لائن (پورٹگھوا، کنٹونیز، انگاش) : (852) 2337 2121

متعلقہ ویب سائٹس (چینی / انگاش)

ہانگ کانگ کا ورچوئل (آن لائن) ایڈز کا دفتر: www.aids.gov.hk

ریڈ رین سنٹر ویب سائٹ: www.rrc.gov.hk

ایڈز ہاٹ لائن ویب سائٹ: www.27802211.com

ہم جنس پرست مردوں کیلئے ایچ ای وی کی معلومات کے لئے ویب سائٹ: www.21171069.gov.hk

PA/AO/20-09(O)/GEN-INF

ایڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا



Urdu version
بھاسٲانٲاٲو



بھاسٲاٲاٲو
بھاسٲاٲاٲو



بھاسٲاٲاٲو
بھاسٲاٲاٲو




بھاسٲاٲاٲو
بھاسٲاٲاٲو



بھاسٲاٲاٲو
بھاسٲاٲاٲو

ریڈ رین سنٹر - یو این ایڈز (UNAIDS) کو لیبرٹنگ سنٹر فار ٹکنیکل سپورٹ، ہانگ کانگ کی جانب سے تیار شدہ



ایڈز کیا ہے؟

ایڈز کا پورا نام ایکوائرڈ ایمو ڈیفینسنسی سینڈروم ہے۔ ایڈز ہومن ایمو ڈیفینسنسی وائرس (HIV) کیوجہ سے ہوتی ہے۔ ایچ آئی وی، CD4 خلیوں جو کہ مدافعتی نظام میں بیماری کے خلاف لڑتے ہیں، پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرتا ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام بری طرح سے بگڑ جاتا ہے، اسلئے متاثرہ شخص آسانی سے کچھ اقسام کے کینسر اور بہت سی دوسری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان قسم کی بیماریوں کو موقع پرست بیماریاں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کے کمزور مدافعتی نظام سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔

ایچ آئی وی ایک شخص سے دوسرے کو کیسے منتقل ہوتا ہے؟

ایچ آئی وی بنیادی طور پر متاثرہ شخص کے خون، نطفہ یا اندام نہانی کے مائع میں پایا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل ایچ آئی وی ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہونے کے سب سے عام طریقے ہیں:

- ایچ آئی وی سے متاثرہ شخص کے ساتھ مباشرت کرنے سے (فرجی، منہ سے یا مقعدی)۔ بانگ کانگ
- میں ایچ آئی وی سے متاثرہ 80 فیصد لوگوں میں یہ جنسی تعلق کے ذریعے منتقل ہوتا ہے؛
- کسی ایچ آئی وی سے متاثرہ شخص کے ساتھ سونیاں، سرنجیں یا دوسرے انجکشن کے آلات کو استعمال کرنا؛
- ایچ آئی وی سے متاثرہ خواتین سے انکے بچوں کو پیدائش کے دوران یا پہلے یا پیدائش کے بعد بچے کو اپنا دودھ پلانے سے؛
- ایچ آئی وی، متاثرہ خون یا خون والی اشیاء کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔

کیا عام میل سے مجھے ایچ آئی وی ہو سکتا ہے؟

ایچ آئی وی روزمرہ کی سرگرمیوں جیسا کہ ہاتھ ملانا یا بغل گیر ہونے سے نہیں پھیلتا۔ آپ گالوں پر بوسہ کرنے، ساتھ کھانا کھانے یا ایک ہی لیٹرین سیٹ استعمال کرنے سے متاثر نہیں ہوسکتے۔ اسکے علاوہ اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ مچھر بھی ایچ آئی وی منتقل کر سکتے ہیں۔

مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کسی کو ایچ آئی وی ہے؟

ایچ آئی وی سے متاثرہ بہت سے لوگ بیمار نظر نہیں آتے، کسی کو دیکھ کر یا اس سے باتیں کر کے یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس شخص کو ایچ آئی وی ہے۔ ایچ آئی وی سے متاثرہ شخص دوسروں کو وائرس منتقل کر سکتا ہے حتیٰ کہ جب کوئی علامات بھی نہ ظاہر ہو۔ کسی کو ایچ آئی وی ہے اسکا پتا صرف ایچ آئی وی اینٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے ہی لگ سکتا ہے۔



ایچ آئی وی اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا ہے؟

اپکے جسم کو کوئی بیماری لگنے کی صورت میں اینٹی باڈیز آپ کے خون میں بنتی ہیں۔ اینٹی باڈیز بیماریوں کے خلاف جسم کا ہتھیار ہیں۔ لیکن ایچ آئی وی کے خلاف اینٹی باڈیز قدرتی طور پر مدافعتی نہیں۔ ایچ آئی وی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ خون کا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ میں ایچ آئی وی کا پتا چلانے کیلئے کیا جاتا ہے۔

اگر ایچ آئی وی اینٹی باڈیز موجود ہیں تو ٹیسٹ مثبت ہے۔ اسکا مطلب ہے شخص ایچ آئی وی سے متاثرہ ہے۔

اگر ونڈو پیریڈ (مخصوص وقت جو ایچ آئی وی سے متاثرہ شخص میں وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بننے میں لگتا ہے) کے گزر جانے کے بعد آپ کا نتیجہ جہ منفی ہے تو اسکا مطلب ہے آپ ایچ آئی وی سے متاثرہ نہیں ہے۔

ونڈو پیریڈ کیا ہے؟

ونڈو پیریڈ پہلے ایچ آئی وی انفکشن سے لیکر مثبت نتیجہ آنے تک کا درمیانی وقت ہے۔ ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کیلئے ونڈو پیریڈ تین ماہ ہے۔ ونڈو پیریڈ کے دوران، نتیجہ منفی ہونے کے باوجود، متاثرہ شخص وائرس منتقل کر سکتا ہے۔



کیا ایڈز کا کوئی علاج ہے؟

اس وقت ایڈز کا کوئی علاج نہیں لیکن ادویات ایچ آئی وی اور اسکی پیچیدگی کے ساتھ لڑنے میں موثر ہیں۔ کچھ دوائیاں موقع پرست بیماریوں اور ایچ آئی وی سے متعلق دیگر بیماریوں کو روکنے یا علاج کرنے کیلئے دستیاب ہیں۔ اینٹی ریٹروائرل تھراپی (جنیاتی وائرسز مثلاً ایچ آئی وی کی روک تھام کی تکنیک) کا استعمال موثر طور پر ایچ آئی وی پر قابو پا کر اسکی دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔

ایچ آئی وی ٹریمنٹ، ایچ آئی وی سے متاثرہ لوگوں کو زیادہ عرصہ تک زندہ رکھنے میں مددگار ہے۔ دوسری بیماریوں کی طرح، جلدی انکشاف علاج اور روک تھام کے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔

کیا مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے؟

اگر آپ یا آپ کے مباشرتی ساتھی نے کبھی غیر محفوظ مباشرت، جنسی بیماریوں یا کسی کے ساتھ سونیاں یا سرنجیں استعمال کی ہوتی ہیں تو آپکو ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ برائے مہربانی مفت اور شناخت کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ایچ آئی وی (HIV) اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کے لئے ایڈز کی ہاٹ لائن 2780 2211 (852) پر فون کریں۔



ایچ آئی وی انفکشن سے میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا/سکتی ہوں؟




1

اگر آپ مباشرت کریں تو ہمیشہ کنڈم کا استعمال کر کے خود کو اور اپنے ساتھی کو محفوظ بنائیں۔ فرجی، منہ سے یا مقعدی مباشرت کے وقت کنڈم کا صیح اور ڈھنگ سے استعمال ایچ آئی وی کی منتقلی کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔

کسی کو دیکھ کر یہ بتانا ممکن نہیں کہ اس شخص کو ایچ آئی وی ہے۔ اسلئے اگر آپکا ساتھی کنڈم کے استعمال سے انکار کرتا ہے تو مباشرت ہی نہ کریں۔



3



سونیاں، سرنجیں یا دوسرے انجکشن کے آلات کے استعمال میں شراکت دار مت بنیں۔

2



مباشرت سے پہلے شراب یا منشیات کا استعمال نہ کریں۔ ایسی چیزیں آپکے فیصلہ کی قوت پر اثر انداز ہوکر کنڈم کے استعمال سے روک سکتی ہیں۔

4



اگر آپ حاملہ ہے یا ہونے کا ارادہ ہے تو جلد از جلد ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کروائیں۔ نتیجہ مثبت آنے کی صورت میں، کچھ ادویات کا علاج ایچ آئی وی کی بچے میں منتقلی کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔